

Circular 03

Castelo Branco, 08 de março, 2021

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DE CASTELO BRANCO

PRUNÓIDEAS

Pessegueiros

Lepra

As condições meteorológicas registadas são muito favoráveis ao desenvolvimento deste fungo. A intensidade desta doença depende também da suscetibilidade das variedades, quantidade de inóculo existente e humidade. Considerando que os pessegueiros a partir do abrolhamento dos gomos foliares, são muito suscetíveis à lepra, aconselha-se um tratamento preventivo. Deve renovar o tratamento, sempre que as condições meteorológicas sejam favoráveis ao desenvolvimento deste fungo. Consulte a lista de produtos na circular anterior.

Cerejeiras

Cilindrosporiose, Crivado, Moniliose

Deve prevenir o aparecimento destas doenças realizando tratamento com fungicida homologado antes da ocorrência de precipitação. Acompanhe na sua parcela a evolução do estado fenológico da cultura. Após o estado fenológico (C) botões visíveis, não deve aplicar produtos à base de cobre por risco de fitotoxicidade. Consulte circular nº2.

POMÓIDEAS (Macieiras, Pereiras)

Fogo bacteriano (*Erwinia amylovora*)

Com o objetivo de reduzir o inóculo da bactéria e evitar a disseminação desta doença nos pomares de pomóideas da região, aconselha-se um tratamento preventivo ao inchamento dos gomos com um produto à base de cobre.

Psila da pereira

O combate da psila da pereira é dificultado pela sobreposição de gerações, por isso, é muito importante, reduzir as suas populações hibernantes. Aconselha-se no combate aos ovos a aplicação de óleo parafínico. O tratamento deve ser realizado em dias de sol, sem vento e temperaturas suaves. Nota: a aplicação de caulino também vai dificultar as posturas dos ovos das fêmeas hibernantes.

CITRINOS (Míldio)

Recomendamos que mantenha a proteção do pomar seguindo as orientações referidas na circular nº1.

VINHA

Manutenção do solo - Controlo de infestantes


Nas vinhas adultas em que o solo se encontra coberto com infestantes muito desenvolvidas aconselhamos a aplicação de um herbicida sistémico. Sempre que possível, a aplicação de herbicidas deverá limitar-se à zona da linha das videiras. Recomendamos que siga as orientações referidas na circular anterior sobre manutenção do solo. Consulte a lista de herbicidas que junto se anexa.

Horas de frio

Divulgamos em anexo o nº de horas de frio acumuladas no período de 1 de novembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, nos locais das estações meteorológicas automáticas da EACB, calculadas segundo o modelo de Crossa-Raynaud.

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA

Plano de Contingência da '*Xylella fastidiosa*' e seus vetores



A DGAV publicou o [Plano de Contingência da *Xylella fastidiosa* e seus vetores](#) (versão 02) atualizado em linha com as normas estabelecidas no Regulamento de Execução (UE) 2020/1201 da Comissão, relativo às medidas para impedir a introdução e propagação na União Europeia de *Xylella fastidiosa* e que revogou a anterior legislação.

Código de Conduta na Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos



A DGAV procedeu à divulgação do [Código de Conduta na Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos](#). Este código pretende apoiar os agricultores e outros utilizadores de produtos fitofarmacêuticos de utilização profissional.

Avisos Agrícolas 2021 - Renovação da Inscrição: Sr. Agricultor, se ainda não procedeu à inscrição no presente ano nos Avisos Agrícolas, **informa-se que o valor da inscrição foi atualizado para 15,56 € (quinze euros e cinquenta e seis cêntimos)** de acordo com nº2 do Despacho nº4186/2015 de 27 de abril. Junta-se em anexo a ficha de inscrição atualizada. **Considere sem efeito esta informação se já renovou a sua inscrição nos Avisos Agrícolas.**

Horas de frio acumuladas abaixo dos 7° C de 01-11-2020 A 28-02-2021			
ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS	FREGUESIA	CONCELHO	TOTAL
Alcongosta	Alcongosta	Fundão	938,3
Belmonte	Colmeal da Torre	Belmonte	953,6
Brejo	Peroviseu	Fundão	817,6
C. do Galego	Montes da Senhora	Proença-a-Nova	500,1
Cernache	Cabeçudo	Sertã	686,1
Fadagosa	Castelo Novo	Fundão	582,1
Ferro	Ferro	Covilhã	848,5
Lamaçais	Teixoso	Covilhã	866
Malpica	Malpica do Tejo	Castelo Branco	573,2
Oleiros	Estreito	Oleiros	848
Pedrógão	Pedr. S. Pedro	Penamacor	710,2
Penamacor	Benquerença	Penamacor	990,5
Ródão	Perais	Vila V. Ródão	539,1
Várzea	Idanha-a-Nova	Idanha-a-Nova	882,6

HERBICIDAS PARA APLICAÇÃO À PARTE AÉREA DAS INFESTANTES

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Ação	I.S. (dias)	Formulação	Nome comercial/Empresa
Ácido nonanoíco/pelargónico	1º ano	C	-	SL	Beloukha / BELCHIM Katamisa / BELCHIM (SERVAGRONIS)
carfentrazona-etilo	2º ano	C	7	ME	BlackStar / EPAGRO Linor C / AGROTOTAL Shark / SELECTIS Spotlight Plus / BELCHIM
cicloxidime	1º ano	S	28	EC	Focus Ultra / BASF
fluazifope-p-butilo	1º ano	S	28	EC	Campus Top 125 EC / ASCENZA Fusilade Max / NUFARM Monark 125 EC / SELECTIS
glifosato	3º ano	S	28	SL	Ardee XL / UPL IBERIA Buggy Neo / SIPCAM Catamaran / BELCHIM Clinic Direct 360 / NUFARM Clinic UP / NUFARM Glyphoflash XL / JOVAGRO Glyphogan / ADAMA Helosate 450 SL / BELCHIM Helosate Plus / BELCHIM Helosate Plus / EPAGRO Logrado / CQMASSÓ Marqui / SELECTIS Montana Sapec / ASCENZA Montana Supra 450 SL / ASCENZA Piton Forte / LUSOSEM Piton Verde / LUSOSEM Premier 45 Envision / CADUBAL Rodeo TF / BAYER (SERVAGRONIS) Ronagro / AGROTOTAL Roundup Ultra Max / BAYER Rumbo Extra / IQV Agro Satelite / EPAGRO Serenio / GENYEN Touchdown Premium / SYNGENTA
propaquizafope	1º ano	S	30	EC	Agil / ADAMA Zetrola / SYNGENTA
quizalofope-p-etilo	1º ano	S	35	EC	Quick 5 EC / EPAGRO Quizope / SELECTIS Wish Top / ASCENZA

HERBICIDAS DE APLICAÇÃO AO SOLO

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Acção	I.S. (dias)	Formulação	Nome comercial/Empresa
diflufenicão	4º ano	R	-	SC	Batuta / ASCENZA
isoxabena	1º ano	R	-	SC	Cent-7 / IQV Agro e LUSOSEM
oxifluorfena	3º ano	R	-	EC	Dakar Plus / SELECTIS Fuego / ASCENZA Galigan 240 EC / NUFARM
pendimetalina	1º ano	R	-	CS	Inca / IQV Agro Most Micro / SIPCAM Stomp Aqua / BASF
				SC	Activus SC / ADAMA
				EC	Pendinova / GENYEN Sharpen 33 / SHARDA Starlina / EPAGRO Starpendi / NUFARM
penoxsulame	4º ano	R	-	OD	Boavin / CORTEVA Viper / LUSOSEM

HERBICIDAS MISTOS - DE ABSORÇÃO RADICULAR E FOLIAR

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Acção	I.S. (dias)	Formulação	Nome comercial/Empresa
diflufenicão+glifosato	4º ano	S - R	-	SC	Aliado / SELECTIS Fuji / ASCENZA Siroco / ADAMA Zarpa / BASF
diflufenicão+metribuzina	4º ano	S - R - C	-	SC	Tavas / ADAMA
flazassulfurão	3º ano	S - R	75	WG	Chikara / BELCHIM FlazaStar / EPAGRO Herbor Olivit / AGROTOTAL Katana / BELCHIM Minsk / SYNGENTA Orfeu / SELECTIS Zagaia / ASCENZA
flazassulfurão+glifosato	3º ano	S - R	75	WG	Chikara Duo / BELCHIM
glifosato+oxifluorfena	3º ano	S - R	180	SC	Brefor Plus / IQV Agro Laser Plus / EPAGRO
propizamida	1º ano	S - R	180	SC	Kerb Flo / CORTEVA

LEGENDA:
(Modo Acção) - Modo de Acção:

R - residual S - sistémico C - contacto

(I.S.) - Intervalo de Segurança:

É o período de tempo mínimo que deve decorrer, entre a aplicação do produto e a colheita.

ATENÇÃO:

A consulta desta lista não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico.

Formulação:

CS - suspensão de cápsulas
EC - concentrado para emulsão
ME - microemulsão
OD - dispersão em óleo
SC - suspensão concentrada
SL - solução concentrada
WG - grânulos dispersíveis