

VINHA

MÍLDIO

O IPMA prevê queda de precipitação para o fim da semana. Por esta altura já terá terminado a persistência do tratamento recomendado na Circular nº4. Recomenda-se a **realização de um tratamento com um produto sistémico**, de preferência **antes da queda de chuva**, prevista para o **dia 16 de Maio**. Na eventualidade de não conseguir realizar o tratamento antes da queda de precipitação, deve efetuá-lo imediatamente a seguir, recorrendo a produto de ação curativa.

OÍDIO

Mantenha a cultura protegida contra esta doença.

PODRIDÃO CINZENTA

Nas castas mais precoces já se iniciou a floração. Nas parcelas/vinhas onde é habitual a existência de estragos e prejuízos provocados por este inimigo, recomenda-se a realização de um tratamento na fase de floração-alimpa.

POMÓIDEAS

PEDRADO

Renove a **proteção de imediato** do seu pomar, preferencialmente antes da queda de precipitação.

BICHADO

As condições dos últimos dias foram propícias à instalação e evolução deste inimigo. Realize um tratamento com um inseticida de ação ovicida-larvicida.

AFÍDEOS- PIOLHO VERDE E PIOLHO CINZENTO

Mantenha a vigilância do seu pomar. Observe 100 rebentos (2 por árvore), caso contabilize 2% infestados por piolho cinzento e/ou 10 a 15 % por piolho verde, efetue um tratamento.

BATATA

MÍLDIO DA BATATEIRA

Efetue um tratamento de imediato com um produto de ação curativa. Face à previsão de precipitação, repita o tratamento ao término da persistência deste tratamento, posicionando-o preferencialmente antes da chuva.

EPITRIX SP-

Caso não tenha efetuado o tratamento recomendado na Circular nº 4 e/ou na presença de novos sintomas, aplique um inseticida à base de tiaclopride, acetamiprida.

TECIA SOLANÍVORA – ALERTA FITOSSANITÁRIO

A *Tecia solanivora* é uma praga de quarentena que ataca os tubérculos de batata, tendo-se já registado a sua presença em Espanha, na Galiza e nas Astúrias.

A lagarta e os estragos provocados são semelhantes aos da comum traça da batata. No entanto, os orifícios e as galerias são de maior dimensão, com as galerias a penetrarem mais profundamente na polpa da batata.

Se observar batatas com sintomas suspeitos contacte, de imediato, os serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas.

OLIVAL

OLHO DE PAVÃO

As condições meteorológicas previstas apresentam-se favoráveis à instalação desta doença, pelo que se recomenda a renovar a proteção do olival. Evite a realização de tratamentos durante a fase de plena floração.

CITRINOS

PSILA AFRICANA DOS CITRINOS- TRIOZA ERYTREA

Relembra-se a **obrigatoriedade de realização das medidas fitossanitárias** por todos os **proprietários** ou **detentores** de plantas de **citrinos** localizadas nas freguesias da Zona Demarcada.)

➤ **OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO FREQUENTE (INTERVALOS DE 2-3 SEMANAS) DE TODAS AS PLANTAS DE CITRINOS LOCALIZADAS EM ZONA DEMARCADA.**

Para esta finalidade encontram-se homologados os produtos de uso profissional: **EPIK SG, CONFIDOR O-TEQ, NUPRIDE 220 SL, ACTARA 25 WG** e o de uso não profissional: **POLYSEC ULTRA PRONTO**.

➤ Confirmada a presença de sintomas da praga realize, de imediato, **podas** dos rebentos do ano e proceda à **sua destruição** por fogo ou enterramento no local.

➤ **A comercialização de plantas** de citrinos em zona demarcada só pode ocorrer em **locais que cumpram os requisitos** exigidos. <http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV>.

➤ Proibição de movimentar qualquer planta ou parte de planta (ramos, folhas, ..., exceto frutos) do local.

Mantenha-se atento e, na presença de sintomas suspeitos, contacte a Direção Regional de Agricultura da sua área.

Consulte a lista atualizada de freguesias incluídas em Zona Demarcada em <http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=221911&cboui=221911>