

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA

VINHA

MÍLDIO

Constata-se a persistência de sintomas em algumas vinhas da Região, observando-se a presença de esporulações do fungo em cachos e em folhas. As manhãs frescas e húmidas previstas para os próximos dias são favoráveis ao desenvolvimento do fungo, com intensificação da esporulação. Assim, de modo a diminuir a quantidade de inóculo existente nestas parcelas, sugere-se a realização, com brevidade, **de um tratamento com um fungicida de ação anti-esporulante**. Evite a realização do tratamento nas horas/dias de maior calor.

OÍDIO

As manhãs nubladas são propícias à instalação e desenvolvimento desta doença. Mantenha a vinha protegida adicionando um anti-oídio à calda.

PODRIDÃO CINZENTA E PODRIDÃO NEGRA

Nas parcelas com histórico de estragos e/ou prejuízos causados por podridão cinzenta, aconselha-se a realização de um tratamento à medida que forem atingindo a fase de floração-alimpa.

Para a podridão negra mantém-se a recomendação de implementação de uma estratégia de luta combinada com a do míldio e do oídio.

POMÓIDEAS

PEDRADO

As neblinas matinais são favoráveis à instalação e desenvolvimento da doença. Nas árvores/parcelas onde persistam sintomas de pedrado, realize um novo tratamento com brevidade.

BICHADO

Caso não tenha efectuado o tratamento recomendado na circular anterior e contabilize entre 0,5 a 1% dos frutos atacados em 1000 observados, proceda a um tratamento com um produto de ação larvicida.

AFÍDEOS- PIOLHO VERDE E PIOLHO CINZENTO

Continuamos a observar focos destas pragas, em particular na vegetação mais jovem. Mantenha a

vigilância e caso contabilize 2% de rebentos infestados por piolho cinzento e/ou 10 a 15 % por piolho verde em 100 rebentos observados (2 rebentos por árvore X 50 árvores), efetue um tratamento.

BATATA

MÍLDIO DA BATATEIRA

Os sintomas da doença continuam bem visíveis em algumas plantações da Região. As manhãs húmidas e o recurso a rega por aspersão são propícios à ocorrência de novas infeções. Mantenha a cultura protegida.

EPITRIX SP.

Permaneça atento à presença de pequenos furos circulares em folhas ou a presença de insetos de epitrix na sua plantação. Caso detete sintomas desta praga, realize um tratamento com um inseticida homologado à base de acetamiprida.

CITRINOS

AFÍDEOS - PIOLHO VERDE, PIOLHO CINZENTO E PIOLHO NEGRO DOS CITRINOS- TOXOPTERA CITRICIDUS KIRKALDI

Esteja atento à presença destes inimigos nas suas árvores de citrinos. Caso contabilize 5-10% de rebentos atacados por piolho verde e/ou 25-30% por piolho cinzento, realize um tratamento com um inseticida homologado.

PSILA AFRICANA DOS CITRINOS- TRIOZA ERYTREA

Na publicação Despacho nº 5573/2020, do dia 18 de maio de 2020, procedeu-se a nova atualização das zonas demarcadas. Mantém-se a **obrigatoriedade** de realização das medidas fitossanitárias respeitantes à comercialização e à erradicação da praga (tratamentos, corte e destruição de partes vegetais infestadas) por todos os **proprietários** ou **detentores** de plantas **de citrinos** localizadas nas freguesias da Zona Demarcada.

Consulte a lista atualizada de freguesias incluídas em Zona Demarcada em <https://dre.pt/application/file/a/133880252>

Caso detete sintomas suspeitos deste organismo contacte a Direção regional de Agricultura da sua área.