

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA

VINHA

PODRIDÃO CINZENTA

Nas parcelas de maturação mais tardia e com histórico de podridão cinzenta recomenda-se a realização de um tratamento, dirigido aos cachos, nas 3 a 4 semanas antes da vindima.

MÍLDIO

As neblinas matinais que se têm verificado, são favoráveis ao aparecimento de míldio mosaico na folhagem.

Nas parcelas onde persistem focos da doença, sugere-se a realização de um tratamento com um fungicida com cobre na sua composição.

A orientação da calda para a vegetação e para a zona de frutificação tem efeito sobre o atempamento das varas e a instalação e desenvolvimento da podridão cinzenta.

TRAÇA DA UVA

Nos nossos postos de Observação Biológica não se atingiu o Nível Económico de Ataque (NEA). Mantenha a vigilância, em particular, nas vinhas de colheita mais tardia com histórico de ataques de traça da uva. Observe 100 cachos, e **apenas** realize um tratamento se detetar posturas e/ou perfurações em 1 a 10% dos cachos observados.

POMÓIDEAS

MOSCA DA FRUTA

As condições climatéricas das últimas semanas não foram propícias à instalação e desenvolvimento da praga. Com a atual diminuição da temperatura e a presença de capturas nas nossas armadilhas aumenta a probabilidade de instalação da praga. Mantenha a vigilância do seu pomar, em particular os de colheita mais tardia, caso detete a presença da praga, efetue um tratamento de imediato.

ARANHIÇO VERMELHO

As elevadas temperaturas são favoráveis ao desenvolvimento da praga. Mantenha a vigilância do seu pomar.

OLIVAL

MOSCA DA AZEITONA

As posturas ocorridas durante o período quente que se fez sentir não evoluíram. No entanto, com a descida da temperatura e o aumento de humidade, as posturas agora realizadas podem evoluir. Observe 200 frutos (10 frutos x 20 árvores). Caso observe 1% de frutos com formas vivas, no caso de variedades para conserva, ou 8 a 12% de frutos atacados com formas vivas, no caso de variedades para azeite, efetue um tratamento com um inseticida à base de uma das seguintes substâncias ativas : acetamiprida; Beauveria Bassiana estirpe ATCC 74040, cipermetrina; deltametrina; dimetoato; fosmete; lambda-cialotrina, spinosade.

CITRINOS

PSILA AFRICANA DOS CITRINOS- TRIOZA ERYTREA

Em complemento à obrigatoriedade de realização das medidas fitossanitárias enunciadas na [Portaria nº 142/2020](#), de 17 de Junho, referidas na última circular, a DGAV emitiu uma Autorização Excecional de Emergência (em anexo) de produtos fitofarmacêuticos para aplicação em citrinos em Modo de produção biológico para o controlo da psila africana dos citrinos (Trioza erytreae Del Guercio).

Trata-se de produtos fitofarmacêuticos com base em azaridactina, óleo parafínico, óleo de laranja e piretrinas, que se vêm juntar aos produtos de uso profissional EPIK SG e EPIK SL, e ao de uso não profissional POLYSEC ULTRAPRONTO.

Consulte a lista de freguesias que constituem a zona demarcada na atualização constante do [Despacho nº 23/G/2020](#), publicado pela DGAV no passado dia 28 de Julho.