

## VINHA

### Míldio

O IPMA prevê ocorrência de alguma precipitação para este fim-de-semana e as manhãs têm estado frescas e orvalhadas, encontrando-se a maior parte das vinhas da região no início do pintor. Nesta fase a aplicação de cobre protegerá a folhagem recente de infeções favorecidas pelas condições de humidade, melhorará o atempamento das varas e endurecerá a película dos bagos conferindo-lhes maior resistência. Recomendamos a aplicação do tratamento com cobre particularmente em vinhas onde os orvalhos matinais se façam sentir até mais tarde.

### Doenças do lenho (Esca e botriosferiose)

Nesta altura deve marcar todas as videiras com sintomas destas doenças para que as possa remover no inverno. As videiras afetadas podem morrer bruscamente (apoplexia), ou apenas manifestar sintomas na folhagem (forma crónica) caracterizados por manchas entre as nervuras, de cor castanha e avermelhada nas castas tintas e amarelada nas castas brancas. Essas folhas acabarão por murchar e secar. Nas videiras afetadas com a forma crónica a produção nunca atinge a plena maturação acabando essas cepas por definharem e morrerem.

## MACIEIRA

### Bichado-da-Fruta

Recomendamos renovação de tratamento assim que terminar a persistência do anterior, devido à intensificação do voo nos nossos postos biológicos e uma vez que as condições se encontram favoráveis ao desenvolvimento da praga.

### Cochonilha de S. José

Atingiu-se o somatório de temperaturas para a ocorrência da 2ª geração de Cochonilha de S. José nos Postos de Observação Biológica e foram detetadas as primeiras eclosões.

Aconselha-se a realização de tratamento apenas nos pomares/parcelas onde se verifique a presença da praga.

Nota: opte por um produto que combata em simultâneo ambas as pragas.

### Aranhico vermelho

Continuamos a recomendar a estimativa de risco no seu pomar, observando 100 folhas do terço superior do ramo. Deve realizar um tratamento contra a praga apenas quando observar 45 a 50% de folhas com forma móveis de aranhico vermelho.

### Pedrado

Devido à previsão de precipitação e se no seu pomar existem manchas ativas de pedrado, deve efetuar um tratamento caso venha a ocorrer essa precipitação.

## PEQUENOS FRUTOS – Mirtilo

### Mosca-da-asa-Manchada (*Drosophila suzukii*)

Deve continuar a proceder de acordo com as recomendações nas circulares anteriores no que diz respeito à retirada dos frutos sobrematurados ou rejeitados, mantendo as armadilhas e substituindo regularmente o líquido atrativo.

Caso tenha terminado a colheita deve abrir as redes de proteção contra os pássaros, para que possam entrar e comer os frutos caídos no chão ou esquecidos nas plantas de forma a reduzir a praga para o próximo ano.

A equipa técnica da EADão

Segue em anexo o folheto informativo sobre a regulamentação e procedimento para acesso ao **Título de Reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar**