

# AVISOS AGRÍCOLAS

## ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA

### OLIVAL

#### GAFA

O IPMA prevê a ocorrência de precipitação a partir do início da próxima semana. Esta precipitação irá encontrar os olivais desprotegidos face ao último tratamento. Aconselha-se a realização de um tratamento, imediatamente antes da chuva ou logo após, em particular nas parcelas onde se observam frutos picados pela mosca da azeitona e/ou onde já são visíveis sintomas da doença.

#### OLHO DE PAVÃO E CERCOSPORIOSE

Tendo em consideração as condições meteorológicas previstas, sugere-se a realização de um tratamento com um produto à base de cobre.

Nota: Opte por produtos que combatam em simultâneo estas três doenças.

### VINHA

#### DOENÇAS DO LENHO

Identifique/marque as plantas com sintomas com vista a facilitar a implementação das medidas de recuperação ou de remoção durante o repouso vegetativo.

### POMÓIDEAS

#### PEDRADO

Nos pomares onde se detetaram sintomas da doença, de modo a reduzir o inóculo para o próximo ano, aconselha-se a aplicação de ureia a 5% à queda da folha. A calda deve ser aplicada não só na copa das árvores, mas também nas folhas já caídas no solo.

### CITRINOS

#### PSILA AFRICANA DOS CITRINOS- TRIOZA ERYTREA

Tendo presente as medidas referidas na Portaria nº 142/2020, de 17 de Junho, portaria que estabelece as medidas de proteção fitossanitária adicionais destinadas à erradicação no território nacional do inseto de quarentena *Trioza erytreae* Del Guercio, os proprietários, usufrutuários ou rendeiros dos vegetais hospedeiros localizados na zona demarcada devem:

a) Realizar tratamentos fitossanitários com produtos fitofarmacêuticos autorizados e manter um registo da realização dos tratamentos;

b) Em caso de presença de sintomas da *Trioza erytreae* Del Guercio, proceder de imediato ao corte dos ramos infestados e destruir os detritos vegetais pelo fogo, por trituração ou enterramento no local;

c) Não movimentar para fora do local qualquer vegetal ou parte de vegetal hospedeiro, exceto frutos e sementes.

Consulte a lista de freguesias inseridas em Zona Demarcada em <http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=221911&cboui=221911>.

### ACTINÍDEA - KIWI

#### PSA DO KIWI

Reforçamos a importância da implementação de medidas e práticas culturais que atuem ao nível da prevenção da instalação e disseminação da doença pelo pomar.

### INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA

#### TECIA SOLANÍVORA – ALERTA FITOSSANITÁRIO

A *Tecia solanivora* é uma praga de quarentena que ataca os tubérculos de batata. A lagarta é semelhante à traça da batata, mas provoca orifícios e galerias de maior dimensão, com as galerias a penetrarem mais profundamente na polpa da batata.

#### XYLELLA FASTIDIOSA

A *Xylella fastidiosa* é uma bactéria de quarentena que tem como hospedeiros um grande leque de espécies vegetais entre as quais: Oliveira, Amendoeira, Citrinos, Loendros, Carvalhos, entre outras. Os sintomas mais frequentes são o amarelecimento ou acastanhamento da bordadura ou ápice das folhas e a morte de ramos.

Caso detete sintomas que se lhe afigurem suspeitos contacte os serviços da Direção Regional de Agricultura da sua área.