



Estação de Avisos da Bairrada

ÍNDICE

Circular nº 14/19

Anadia, 16 de Dezembro de 2019

## VINHA

### DOENÇAS DO LENHO - MEDIDAS PREVENTIVAS

Deixe as videiras/vinhas com sintomas de doenças do lenho e passíveis de recuperação, para podar por último e em dias secos e frios.

As videiras mortas, assim como a lenha de poda resultante de parcelas com presença da doença, devem ser retiradas da parcela e queimadas, de preferência no local e com brevidade.

### COCHONILHAS - MEDIDAS PREVENTIVAS

Nas videiras que apresentem e/ou tenham sido assinaladas com sintomas de cochonilhas, nomeadamente com fumagina (vulgarmente designada de "ferrujão"), proceda ao descasque do tronco e/ou corte das varas atacadas, queimando de imediato este material.

## ACTINÍDEA - KIWI

### PSA DO KIWI

A colheita dos frutos, a queda das folhas e o frio provocam feridas através das quais pode penetrar a bactéria causadora da doença.

Nos pomares onde a doença se encontra presente, sugere-se a realização de tratamentos com um dos produtos homologados à base de cobre, 2-3 tratamentos até ao final da queda das folhas.

Adote medidas preventivas durante a operação de poda:

- Evite podar com tempo de chuva,
- Desinfeite regularmente os utensílios de poda,
- Deixe as plantas/zona do pomar atacadas para podar por último
- queime a lenha de poda com brevidade, evitando a sua deslocação pela parcela.
- Inicie todas as operações culturais pela zona do pomar isenta ou menos afectada pela doença.

## INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA

### XYLELLA FASTIDIOSA

A Xylella fastidiosa é uma bactéria de quarentena que tem como hospedeiros um grande leque de espécies vegetais entre as quais: Oliveira, Amendoeira, Citrinos, Loendros, Carvalhos, entre outras. Os sintomas mais frequentes são o amarelecimento ou acastanhamento da bordadura ou ápice das folhas e a morte de ramos.

## TECIA SOLANÍVORA

A *Tecia solanivora* é uma praga de quarentena que ataca os tubérculos de batata, tendo-se já registado a sua presença em Espanha, na Galiza e nas Astúrias.

A lagarta é semelhante à comum traça da batata, mas provoca orifícios e galerias de maior dimensão, com as galerias a penetrarem mais profundamente na polpa da batata.

**CASO DETETE SINTOMAS QUE SE LHE AFIGUREM SUSPEITOS CONTACTE OS SERVIÇOS DA DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DA SUA ÁREA.**

## POMÓIDEAS

### CANCRO EUROPEU

Nas plantas e/ou pomares atacados recomenda-se a aplicação de uma calda à base de cobre, precedida pelo corte e destruição pelo fogo dos ramos secos e com feridas de cancro.

## CITRINOS

### PSILA AFRICANA DOS CITRINOS- TRIOZA ERYTREA

Nas plantas/parcelas que se encontrem localizadas nas freguesias abrangidas por esta atualização, é **obrigatória a realização das medidas fitossanitárias** por todos os **proprietários** ou **detentores** de plantas de **citrinos** localizadas nas freguesias da Zona Demarcada.

➤ **OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO FREQUENTE (INTERVALOS DE 2-3 SEMANAS) DE TODAS AS PLANTAS DE CITRINOS LOCALIZADAS EM ZONA DEMARCADA.**

Para esta finalidade encontram-se homologados os produtos de uso profissional: **EPIK SG** e o de uso não profissional: **POLYSEC ULTRA PRONTO**.

➤ Confirmada a presença de sintomas da praga realize, de imediato, **podas** dos rebentos do ano e proceda à **sua destruição** por fogo ou enterramento no local.

➤ **A comercialização de plantas** de citrinos em zona demarcada só pode ocorrer em **locais/abrigos devidamente licenciados pela DGAV, tendo para tal que cumprir os requisitos técnicos** exigidos.

➤ Proibição de movimentar qualquer planta ou parte de planta (ramos, folhas, ..., exceto frutos) do local.

Mantenha-se atento e, na presença de sintomas suspeitos, contacte a Direção Regional de Agricultura da sua área.

Consulte a lista atualizada de freguesias incluídas em Zona Demarcada em <http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV>.