

# AVISOS AGRÍCOLAS

## ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA

### VINHA

#### DOENÇAS DO LENHO - MEDIDAS PREVENTIVAS

As videiras/vinhas com sintomas de doenças do lenho e passíveis de recuperação, devem ser deixadas para podar por último e em dias secos e frios.

As videiras mortas, assim como a lenha de poda resultante de parcelas com presença da doença, devem ser retiradas da parcela e queimadas, de preferência no local e com brevidade.

#### COCHONILHAS - MEDIDAS PREVENTIVAS

Nas videiras que apresentem sintomas de cochonilhas e/ou tenham sido previamente assinaladas, nomeadamente com fumagina (vulgarmente designada de "ferrujão"), recomenda-se que proceda ao descasque do tronco e/ou corte das varas atacadas, queimando de imediato este material.

### POMÓIDEAS

#### CANCRO EUROPEU

Nas plantas e/ou pomares atacados recomenda-se o corte e destruição (pelo fogo) dos ramos secos e com feridas de cancro, seguida da aplicação de uma calda à base de cobre.

### INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA

#### TECIA SOLANÍVORA – ALERTA FITOSSANITÁRIO

A *Tecia solanivora* é uma praga de quarentena que ataca os tubérculos de batata. Os estragos são semelhantes aos provocados pela traça da batata, mas origina orifícios e galerias de maior número e dimensão, que penetrarem mais profundamente na polpa da batata comprometendo a sua conservação, comercialização e utilização.

#### XYLELLA FASTIDIOSA

A *Xylella fastidiosa* é uma bactéria de quarentena que tem como hospedeiros um grande leque de espécies vegetais entre as quais: Oliveira, Amendoeira, Citrinos, Loendros, Carvalhos, entre outras. Os sintomas mais frequentes são o amarelecimento ou acastanhamento da bordadura ou ápice das folhas e a morte de ramos.

Caso detete sintomas que se lhe afigurem suspeitos contacte os serviços da Direção Regional de Agricultura da sua área.

### CITRINOS

#### PSILA AFRICANA DOS CITRINOS- TRIOZA ERYTREA

De acordo com a Portaria nº 142/2020, de 17 de Junho, portaria que estabelece as medidas de proteção fitossanitária adicionais destinadas à erradicação no território nacional do inseto de quarentena *Trioza erytreae* Del Guercio, os proprietários, usufrutuários ou rendeiros dos vegetais hospedeiros localizados na zona demarcada devem:

- Realizar tratamentos fitossanitários com produtos fitofarmacêuticos autorizados e manter um registo da realização dos tratamentos;
- Em caso de presença de sintomas da *Trioza erytreae* Del Guercio, proceder ao corte dos ramos infestados e destruir os detritos vegetais pelo fogo, por trituração ou enterramento no local;
- Não movimentar para fora do local qualquer vegetal ou parte de vegetal hospedeiro, exceto frutos e sementes.

Consulte a lista de freguesias inseridas em Zona Demarcada em <http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=221911&cboui=221911>.

### ACTINÍDEA - KIWI

#### PSA DO KIWI

A colheita dos frutos, a queda das folhas e o frio provocam feridas através das quais entra a bactéria causadora da doença.

Nos pomares onde a doença se encontra presente, sugere-se a realização de tratamentos com um dos produtos homologados à base de cobre, 2-3 tratamentos até ao final da queda das folhas.

Recomenda-se ainda a adoção de medidas preventivas durante a operação de poda:

- Evite podar com tempo de chuva,
- Desinfete frequentemente os utensílios de poda,
- Deixe para o fim as zonas mais atacadas do pomar.
- queime a lenha de poda com brevidade, evitando a sua deslocação pela parcela.
- Inicie todas as operações culturais pela zona do pomar isenta ou menos afectada pela doença.

